

# Lecitop



BIOCONTROL



LECITINA DE SOJA  
SUSTANCIA BÁSICA BIOCONTROL



# Lecitop



## SUSTANCIA BÁSICA BIOCONTROL, BASADA EN LECITINA DE SOJA CON EFECTO FUNGICIDA Y FORTIFICANTE

### DESCRIPCIÓN

**LECITOP** es un producto natural basado en la lecitina de soja, que contiene sustancias como fosfolípidos, ácidos grasos esenciales, colina, inositol, fósforo y vitaminas. Las lecitinas están clasificadas como Sustancias Básicas de acción FUNGICIDA, según informe SANCO 12798/2014 y están reguladas en el artículo 23 del Reglamento (CE) 1107/2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**LECITOP**, endurece la pared celular de los cultivos, al mismo tiempo que da plasticidad a los frutos evitando fisiopatías y mejorando la consistencia. Así mismo, ejerce una actividad hidrófoba sobre la superficie foliar, evitando que las humedades relativas reposen sobre la superficie vegetal reduciendo la proliferación de hongos aéreos.

Se puede usar de forma genérica contra la gran mayoría de hongos que causan perjuicios.

### BENEFICIOS DEL LECITOP

- Es un efectivo antioxidante proporcionando longevidad y turgencia en frutas y verduras.
- Mejora la anomalías en la piel dando color y brillo, por lo que hace al fruto más atractivo a la vista.
- Cicatriza pequeñas fisiopatías y heridas de los frutos.
- Mejora la sanidad vegetal en general, disminuyendo ataques de hongos y bacterias.

### RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

CULTIVO	Enfermedad	Dosis	Aplicación
Manzano	Mildiu "Podospaera leucotricha"	750 cc/Hl	Entre 3 a 12 aplicaciones Hinchado de yemas hasta frutos al 90% -cada 5 días
Melocotonero	Taphrina deformans Lepra ó abolladura	750 cc/Hl	Entre 3 a 12 aplicaciones Hinchado de yemas hasta frutos al 90% -cada 5 días
Viñedo	Mildiu, "Pasmopara viticola", Oidio "Erysiphe necator"	750 cc/Hl	Entre 3 a 12 aplicaciones hoja sin desplegar hasta ablandamiento de baya. Cada 5 días
Hortalizas Pepino Calabazin Melón	Oidio "Podospaera xhantii Oidio"	1.500 cc/Hl	Entre 2 a 12 aplicaciones Cotiledones hasta la maduración completa. Intervalo: 5 días.
Patata	Mildiu "Phytophthora infestans"	1.800 cc/Hl	Entre 3 a 12 aplicaciones 9 hojas hasta maduración Cada 5 días

### PROPIEDADES Y TECNOLOGÍAS

