

Dunyaquel

Boromol



DESCRIPTION

DUNYAQUEL BOROMOL est une solution liquide composée d'acides aminés d'origine animale, de Bore et de Molybdène, hautement soluble et facilement assimilable par les cultures. Sa formulation, dotée d'un **Aminogramme très équilibré**, confère au produit des propriétés biostimulantes et renforce la systémie des microéléments apportés, de telle sorte que la vitesse d'absorption et de translocation dans la plante augmente, améliorant ainsi l'efficacité et les effets agronomiques bénéfiques


CARACTÉRISTIQUES

Le bore est un micronutriment qui joue un rôle structural important et essentiel dans la croissance des plantes, étant un agent d'importance vitale dans le métabolisme des acides nucléiques et des hydrates de carbone. Elle est également directement impliquée dans la floraison et la nouaison, et sa carence peut entraîner une perte de production agricole.

Le molybdène est impliqué dans la production de l'enzyme nitrate réductase. Il est impliqué dans les processus liés à l'efficacité de l'azote.

Produit **APPROUVÉ** pour une utilisation en agriculture biologique conformément au règlement (UE) 2018/848.

PROPRIÉTÉS



CONTENUS DÉCLARÉS

ENGRAIS À BASE D'ACIDES AMINÉS AVEC BORE (B) ET MOLYBDÈNE (Mo).	m/m
Acides aminés libres	2,0 %
Bore (B) soluble dans l'eau	3,0 %
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau	3,5 %
pH	7-8
Densité	1,19 g/cm ³

AMINOGRAMME: A.Aspartico-A.Glutámico-Alanina-Arginina-Cisteína-Fenil Alanina-Glicina Hidroxiprolina-Histidina-Isoleucina-Lisina-Metionina-Prolina-Serina-Tirosina-Treonina-Valina
Aucun acide aminé ne dépasse 20 % du total.

Dunyaquel

Boromol

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET DE DOSAGE

De nombreuses cultures réagissent favorablement à l'apport de bore et de molybdène. Dans le cas du **bore**, les cultures qui réagissent le mieux à son application sont, entre autres, la luzerne, la betterave, l'olive, le brocoli, la pomme, la carotte, le chou-fleur, le tournesol, le colza et la vigne.

Melon dans le cas du **molybdène**, les cultures qui réagissent le mieux à son application sont le chou-fleur, les oignons, la laitue, le melon et les légumineuses.

APPLICATION RECOMMANDÉE PAR LA CULTURE



CULTURE	Dosage/Application	Dosage/Application	Moment de l'application
Arbres fruitiers	2 l/Ha	5 l/Ha	Préfloraison - Nouaison
Olive	2 l/Ha	5 l/Ha	Préfloraison - Nouaison
Vignoble	1-2 l/Ha	3-5 l/Ha	Préfloraison - Nouaison
Plantes légumineuses	1-1,5/Ha		
Chou-fleur, Brocoli	1-1,5/Ha	3l/Ha	Préfloraison - Nouaison
Melon	1-1,5/Ha	3l/Ha	Préfloraison - Nouaison
Luzerne	1-1,5/Ha		
Légumes	1-1,5/Ha	3l/Ha	Préfloraison - Nouaison

PRÉSENTATION

EMBALLAGE STANDARD

EMBALLAGE	1Lt	5Lt	20Lt	1000Lt
BOÎTE	12x1	5x4		

CONFIGURATION DES PALETTES

	360Lt	800Lt	640Lt	1000Lt
	1Lt	5Lt	20Lt	IBC



EN PRENANT SOIN DE L'AGRICULTURE
NOUS PRENONS ÉGALEMENT SOIN DE LA PLANÈTE