

Quitostart



DESCRIPTION

QUITOSTART Chlorhydrate de chitonase, elle est extraite de la chitine, d'origine naturelle, en utilisant comme matière première les squelettes de crustacés marins. C'est un éliciteur, qui a un effet bactéricide et fongicide par la stimulation des mécanismes de défense naturels de la plante.


CARACTÉRISTIQUES

L'application de **QUITOSTART** améliore la fertilité du sol, la vitalité des plantes et le rendement.

- Il augmente la concentration de phytoalexines, des composés phénoliques de faible poids moléculaire ayant une action antimicrobienne.
- Augmente la concentration des protéines liées à la pathogénèse (protéines PR); enzymes à activité antibiotique produites par les plantes et dont l'activité catalytique vise à dénaturer les composants de la paroi cellulaire de l'agent pathogène.
- Favorise la synthèse des dépôts de callose, de lignine et de subérine dans la paroi cellulaire de la plante, renforce aussi les tissus de la culture.
- Réduit l'ouverture des stomates des feuilles, limitant ainsi la capacité des agents pathogènes à accéder à l'intérieur de la plante.

Produit **APPROUVÉ** pour une utilisation en agriculture biologique conformément au règlement (UE) 2018/848

PROPRIÉTÉS



CONTENUS DÉCLARÉS

SUBSTANCE DE BASE UTILE À LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX	p/p
Chlorhydrate de chitosan	2,0 %
Densité	1,02 g/cm ³
pH	3

INFORMATION FACULTATIVE

SUBSTANCE DE BASE UTILE À LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX, SELON LE REGLEMENT (CE) No 1107/2009

QuitoStart

APPLICATION RECOMMANDÉE PAR LA CULTURE

Peut être utilisé en application foliaire sur diverses cultures, avec un intervalle de 2 semaines entre les traitements, en pulvérisant à un volume faible à moyen (200-400 L/Ha).

CULTURE	Inducteur a résistance à:	Dosis	Aplicación
Céréales	Champignons Bactéries	2 a 4,5 l /HI	Application de 4 à 8 applications à partir du début de la maturation.
Horticulture	Champignons Bactéries	2 a 4,5 l /HI	Application de 4 à 8 applications à partir du début de la maturation.
Arbres fruitiers	Champignons Bactéries	2 a 4,5 l /HI	Application de 4 à 8 applications à partir du début de la maturation.
GRAINES	Inductor de resistencia a:	Dosis	Aplicación
Céréales	Champignons Bactéries	2 a 4l/HI	Pulvériser uniformément sur la graine.
Pomme de terre	Champignons Bactéries	2 a 4l/HI	Traiter par trempage ou pulvériser avant le semis.
Betterave rouge	Champignons Bactéries	2 a 8l/HI	Traiter par trempage ou pulvériser avant le semis.

PRÉSENTATION

EMBALLAGE STANDARD

				
EMBALLAGE	1Lt	5Lt	20Lt	1000Lt
BOÎTE	12x1	5x4		

CONFIGURATION DES PALETTES

			
360Lt	800Lt	640Lt	1000Lt
1Lt	5Lt	20Lt	IBC