



Sanitur

DESCRIPCIÓN

SANITUR se ha desarrollado al amparo del RD(CE)1.107/2.009 a partir de "Urtica spp" para proporcionar una herramienta natural y de bajo impacto ambiental contra enfermedades como el mildiu de la patata o plagas como los pulgones.

Sanitur está compuesto de extracto de Ortiga, indicado como producto insecticida, fungicida y acaricida.

CARACTERÍSTICAS

SANITUR, se genera a través de una extracción en medio acuoso, aporta numerosos nutrientes y algunas sustancias activas como flavonoides, taninos, ácidos orgánicos, etc. que promueven un mejor y saludable desarrollo de las plantas.

Estos compuestos orgánicos aplicados sobre las plantas complementan la nutrición, teniendo una respuesta activa cuando son aplicados.

SANITUR, usado de manera continua durante el ciclo de la planta permite alejar las poblaciones de insectos patógenos del cultivo y reducir su impacto sobre los rendimientos.

Es particularmente eficaz sobre los pequeños insectos como los pulgones y los ácaros.

Producto APTO para su uso en agricultura ecológica de acuerdo al reglamento (UE) 2018/848

PROPIEDADES



CONTENIDO DECLARADO

SUSTANCIA BÁSICA ÚTIL EN LA PROTECCIÓN FITOSANITARIA	Cantidad
Urtica spp	15 gr/litro
Densidad	1,05g/cm ³
pH	5-6

FORMA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN FOLIAR: La dosis media de aplicación está entre los 50 a 100 cc/Hl
Para más información consultar cultivos autorizados, plagas y plazos de seguridad.

Sanitur

Cultivo y Objetivo	Dosis	Modo de Aplicación
CONTRA EL PULGÓN /Manzano; Peral; ciruelo;melocotonero; Grosellero (blanco rojo y grosella negra); El nogal;Cerezo; Lechuga (al aire libre); Escarola;Achicoria; Árboles y arbustos ornamentales (no para consumo); Judías verdes y secas;Patatas.	10 l/Hl Caldo de 300 l Ha	1-5 aplicaciones , mojando las hojas y los tallos (en presencia de pulgón) Plazo Seguridad: 7 Días
LA CARPOCAPSA Manzano.	10 l/Hl Caldo de 300 l Ha	1-3 aplicaciones (intervalo entre aplicaciones de 7-21 días). Plazo Seguridad: 7 Días
ALTERNARIOSIS — Manzana; Peral Melocotonero; Cerezo;Brócoli al aire libre); Coliflor (blanco y verde) Coles de Bruselas;Col china; Roseta Packchoi y Komatsuna; Col rizada; Colza; Rábano;Pepinillos; Calabacines Melones; Calabaza.	10 l/Hl Caldo de 300 l Ha	1-6 aplicaciones durante el verano Plazo Seguridad: 7 Días
MONOLIOSE — Manzano; Peral; Durazno; Cerezo.	10 l/Hl Caldo de 300 l Ha	1-6 aplicaciones Plazo Seguridad: 7 Días
BOTRYTIS — Manzano; Ciruelo; Melocotonero; Cerezo.	10 l/Hl Caldo de 300 l Ha	1-6 aplicaciones Plazo Seguridad: 7 Días
ENFERMEDADES DE POST COSECHA Manzano;Ciruelo; Melocotonero Cerezo.	10 l/Hl Caldo de 300 l Ha	1-6 aplicaciones Plazo Seguridad: 7 Días
OÍDIUM — Pepino; Pepinillo; Calabaza y Calabacín.	10 l/Hl Caldo de 300 l Ha	1-6 aplicaciones Plazo Seguridad: 7 Días
MIDIU — Uvas de viña y de mesa Patatas.	10 l/Hl Caldo de 300 l Ha	1-6 aplicaciones , durante el verano Plazo Seguridad: 7 Días.
ACAROS TETRANYCHIDAE — Uvas de viña y de mesa; Judías secas y verdes.	10 l/Hl Caldo de 300 l Ha	1-6 aplicaciones , durante el verano. Plazo Seguridad: 7 Días
ALTICES — Colinabo; Col rizada, Brócoli; Coliflor, Coles de Bruselas; Coles; Col china; Packchoi; Roseta pakchoi y komatsuna; Colza y Rábano.	10 l/Hl Caldo de 300 l Ha	1-6 aplicaciones , durante el verano. Plazo Seguridad: 7 Días
LA PALOMILLA DORSO DE DIAMANTE (PDD) Colinabo;Col rizada, Brócoli; Coliflor, Coles de Bruselas; Coles; Col china;Packchoi; Roseta pakchoi y komatsuna; Colza y Rábano.	10 l/Hl Caldo de 300 l Ha	1-6 aplicaciones , durante el verano. Plazo Seguridad: 7 Días